

Erdbeersortiment

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Erdbeere	-	-	0,80 - 1,00	0,30 - 0,35

Frigopflanzen

Pflanzzeit: April bis Anfang Juli
Vorteile: variabler Pflanztermin, i. d. R. keine Bewässerung erforderlich. Hohe, sichere Erträge
Nachteile: Reife etwas verzögert gegenüber Grünpflanzen

Grünpflanzen

Pflanzzeit: Juli/August
Vorteile: kürzere Kulturzeit, frühe Ernte, später Pflanztermin ermöglicht Vorkultur, besonders gute Fruchtqualität
Nachteile: Jungpflanzen sind teurer als Frigopflanzen, müssen i. d. R. bewässert werden

Allgemein

Die Kultur sollte nicht älter als 3 Jahre sein. Bei älteren Kulturen nimmt die Ertragsleistung ab und Krankheiten treten stärker auf.
Geeignete Vorkulturen: Frühspinat, Salat, Frühkohlartern;
nicht geeignete Vorkulturen: Frühkartoffel (wegen Wurzelpilzen) und Naturwiese (wegen Engerlingen, Drahtwürmern, Stengelälchen).
Mehrjährige Kulturen nach der Ernte abmähen und Laub wegen Krankheiten aus Bestand entfernen - anschließend Kompost aufbringen und bei Trockenheit wässern. Ranken entfernen, damit sich die Pflanzen kräftig entwickeln.

Sorte

Eigenschaften

Darselect

früh (3 Tage vor Elsanta); große, mittelrote, feste Frucht, guter Geschmack, robuste Pflanze gegenüber Wurzelkrankungen, mehltauanfällig

Elsanta

früh; sehr ertragreiche Sorte mit großen festfleischigen Beeren; gut pflückbar, hoch aromatisch, benötigt leichte, durchlässige Böden; anfällig für Verticilliumwelke

Elvira

früh; schwacher Wuchs, kurze Blattstiele, frühe Blüte, daher frostgefährdet; große fest-fleischige Beeren, anfangs hell, später dunkelrot, sehr ertragreich; anfällig für Mehltau

Florence	spät (14 Tage nach Elsanta); starke, dunkelrote Früchte mit gutem Geschmack, braucht Befruchtersorte (Malling Pandora oder Yamaska)
Florika	früh; Erdbeerwiese, Anbau ist für 5-jährige Kultur geeignet; kleine, mittelrote weiche Beeren; nicht transportfest; sehr gutes Aroma; bisher sind keine Krankheiten und Schädlinge aufgetreten, die zur Beeinträchtigung führen
Honeoye	früh (7 Tage vor Elsanta); rote, attraktiv glänzende, sehr große feste Frucht, etwas säuerlich im Geschmack, Hauptfrühsorte im Erwerbsanbau
Kent	aus Kanada stammende robuste Erdbeersorte, kaum anfällig für Frucht- und Wurzelfäule, frühe Reifezeit, sehr gutes Aroma
Kimberly	früh (wie Elsanta); kräftiger Wuchs, geringe Anfälligkeit gegenüber Mehltau, erhöhte Anfälligkeit gegenüber Roter Wurzelfäule, große Frucht, geringere Fruchtfestigkeit als Elsanta
Korona	mittelspät; sehr ertragreiche Sorte mit großen, dunkelroten Früchten; festfleischig, saftig; transportfest; empfindlich gegen Trockenheit, Wurzelfäulen und Fruchtfäulen
Lambada	früh (3 Tage vor Elsanta); besticht besonders durch ihre Geschmacksqualität, große, ansprechende glänzende Frucht, gering anfällig für Verticillium, Rhizomfäulnis und Fruchtfäule, starke Anfälligkeit für Mehltau
Malling Pandora	sehr spät (15 Tage nach Elsanta); guter Geschmack, rote, feste Früchte, rein weibliche Pflanze, braucht Befruchter (Florence)
Symphony	mittelspät (5 Tage nach Elsanta); rote, stark glänzende Früchte, sehr fest, gut haltbar, leicht säuerlicher Geschmack, geringere Anfälligkeit für Wurzelkrankheiten
Tenira	mittelfrüh; mittelstarker Wuchs, reichtragend, gut pflückbare, festfleischige Früchte; wenig anfällig für Fruchtfäulen; stellt hohe Anforderungen an Standort und Pflege; sonst robuste Sorte
Yamaska	spät (14 Tage nach Elsanta); große, feste Frucht mit gutem Geschmack, sehr robust gegenüber Krankheiten, braucht Befruchter (Florence geeignet), für biologischen Anbau geeignet