

Besondere Obstarten

Kiwi bot. Name: Actinia chinensis; Schlingpflanze, Blüten sind einhäusig und entwickeln sich am Frühjahrstrieb, Pflanze ist getrennt geschlechtlich, eine männliche Pflanze auf 8 weibliche Pflanzen;

Reifezeit Anfang bis Mitte November; warme Lagen erforderlich

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Kiwi	Spalier	-	3,50 - 4,00	5,00

Kiwi-Sorte	Pflückreife	Eigenschaften
Hayward (weiblich)	Ende Okt. - Anf. Nov.	starkwüchsig, aromatische Früchte
Starella (weiblich)	Ende Okt. - Anf. Nov.	starkwüchsig, aromatische Früchte
Weiki (weiblich)	Mitte Okt. - Anf. Nov.	extrem frostharte und anspruchslose Kiwi
Matua (männlich)	keine Früchte	lange Blütezeit, schwächerer Wuchs

Loganbeere Dornenlos, frostempfindlich, nur für warme Lagen, große, längliche, dunkelviolettfarbene Früchte; sehr saftig; säuerliches gutes Aroma; sehr druckempfindlich; Anbau wie Brombeeren

Taybeere Kreuzung aus Brombeere und Himbeere, frosthart, sehr große, lange purpurrot gefärbte Beeren (länger als Loganbeere), Anbau wie Brombeeren

Andenbeere Kultur wie Tomaten, Aussaat Anf. Februar in Saatschalen, pikieren, später eintopfen; ab Mitte Mai ins Freiland auspflanzen; die Früchte sind reif, wenn die Außenhülle dürr ist;

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Preiselbeere	Busch	-	1,00 - 1,50	0,50 - 0,80

Kultur-preiselbeere

auf feuchten, moorigen, torfigen Böden mit pH-Werten von 3,2 bis 4,5; vollsonniger Standort

Sorten: "Early Black", "Howes", "Mc Farlin", "Searles", "Ben Lear", "Black Veil", "Pilgrim"

Reifezeit: September bis Oktober

Asienbirne (= Nashi)

warmer sonniger Standort wie Tafelbirnen; selbstunfruchtbar; blütenfrostempfindlich; Frucht weniger aromatisch, jedoch schmelzendes Fruchtfleisch mit erfrischendem Geschmack; Frucht wird am besten an einjährigen Kurztrieben; Früchte reifen im Lager nicht nach; genussreif ernten!

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Nashi	Spindel	Birnen-Sämling	4,00 - 4,50	2,00 - 3,00
	Busch	Birnen-Sämling	3,50 - 4,50	3,00 - 4,00

Nashi-Sorte

Reifezeit

Eigenschaften

Shinsui

früh

sehr süß, bräunlich, gefleckt

Kosui

mittelfrüh

saftig, goldgelb, grobschalig

Shinseiki

mittelspät

sehr süß, goldgelb, glattschalig, guter Befruchter

Nijiseiki

spät

gute Essqualität, gelbgrün, glattschalig, guter Befruchter

Tafeltrauben

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Tafeltraube	Spalier	„Amerikaner“ Reben	3,00 - 4,00	1,30 - 1,60

Muskat Bleu dunkelblaue, mittelfrühe Trauben, gute pilzresistente Weinrebe für den Hausgarten

Phönix weiße Traube, Reifezeit wie Müller-Thurgau, pilzresistente Weinrebe, Beeren sind widerstandsfähig gegen Botrytis, geeignet für den Hausgarten

Boskoop Glory blaue, frühe Trauben, pilzresistente Rebsorte, geeignet für den Hausgarten

Regent blaue, mittelfrühe Trauben, pilzresistente Rebsorte, sehr würzig im Geschmack

Feigen Diese Obstart des Mittelmeerraumes lässt sich bei uns mit Erfolg in großen Kübeln kultivieren, die im Winter in frostfreien Räumen abgestellt werden. An besonders warmen, frostgeschützten Standorten gelingt die Überwinterung im Freien. Dazu ist mindestens eine Abdeckung mit Nadelholzzweigen erforderlich. Bekannt ist das schöne, tiefgelappte Feigenblatt. Früchte tragen nur weibliche Pflanzen.