

Brombeersortiment

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Brombeere	Spalier	-	3,00 - 3,50	2,00 - 3,00

Sorte

Eigenschaften

Hull Thornless

ab Anf. August; kräftiger Wuchs, sehr große feste Beeren mit weniger Säure als Theodor Reimers, ertragreich; leicht frostempfindlich

Kiova

Loch Ness

ab Anfang August; robuste Pflanze, schwacher Wuchs, stachellos, sehr gutes Aroma

Navaho

Anfang August; stachellos, sehr gutes Aroma, festere Beere und geschmacklich besser als Loch Ness, robuste Pflanze

Theodor Reimers

ab Anfang August; sehr kräftiger Wuchs mit bis zu 8 m langen Ruten; viele Geiztriebe; stark bestachelt (auch am Laub); große, weiche aromatische Früchte; nicht ganz winterfest, empfindlich gegen Rutenkrankheiten, Fruchtbotyris und Gallmilbe

Thornfree

(Syn. "Schwarze Perle")

ab Mitte August; mäßig bis stark wachsend; mäßige Verzweigung, stachellos; sehr große, feste Beeren; erst vollreif, wenn der schwarze Glanz matt wird; beste Brombeere für Marmeladenbereitung; hohe Erträge; wenig frostgefährdet; anfällig für Rutenkrankheiten

Thornless Evergreen

(Syn. "Blacky")

ab Anfang August; Liebhaberanbau; zur Begrünung von Pergolen bestens geeignet