

## Pflaumen-, Zwetschen-, Mirabellen- und Reneklodensortiment

### Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Zwetsche, Pflaume, Mirabelle, Reneklode	Spindel Busch Halbstamm	GF 8/1 St. Julien A INRA 655/2	3,50 – 6,00	2,00 - 4,00

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Zwetsche, Pflaume, Mirabelle, Reneklode	Halbstamm Hochstamm	Myrobalanen St.-Julien-Sämling	8,00 - 10,00	5,00 - 6,00

Sorte

Reifezeit, Eigenschaften

---

#### **Auerbacher**

Mitte August - Anf. Sept., mittelgroße bis große, eiförmig rotviolette bis blaue Frucht; starker Wuchs; nicht gleichmäßig reifend

#### **Bühler Frühzwetsche**

Mitte August, mittelgroße, rundliche, feste, blaue Frucht; kräftiger Wuchs; selbstfruchtbar

#### **Čačaks Frühe**

Mitte - Ende Juli, große bis sehr große, violett gefärbte Frucht, starker aufrechter Wuchs; teilweise selbstfruchtbar, scharkatolerante Neuzüchtung

#### **Čačaks Schöne**

Anfang - Mitte August, große prächtig dunkelblaue stark beduftete Früchte, sehr festes Fruchtfleisch, scharkatolerante Neuzüchtung

#### **Chrudimer**

Mitte - Ende August, altbewährte tschechische Sorte, große schwarzblaue Früchte, Fruchtfleisch gelb, scharkatolerant

#### **Deutsche Hauszwetsche**

Ende Sept. - Mitte Okt., weitest verbreitete Hauptsorte, mittelgroße, länglich bis ovale, schwarzblaue Frucht; sehr starker Wuchs; selbstfruchtbar, wertvollste Spätsorte, versch. empfohlene Typen: **Etscheid, Gunser, Meschenmoser, Schüfer, Wolff**

#### **Ersinger Frühzwetsche**

Anfang August, mittel bis große, bei Vollreife blaue Frucht; mittelstarker Wuchs

#### **Elena**

Ende Sept. - Mitte Okt., Neuzüchtung aus Stuttgart-Hohenheim, große ovale dunkelblaue Frucht, als Tafel- und Kuchenzwetsche geeignet, scharkatolerant

#### **Fellenberger**

Mitte August - Mitte Sept., große, langovale, violette bis schwarz-blaue Frucht; kräftiger Wuchs, Synonym: Italienische Zwetsche

<b>Hanita</b>	Mitte - Ende August, Neuzüchtung aus Stuttgart-Hohenheim, scharkatolerant, blauviolette Frucht, mit sehr gutem Geschmack
<b>Herman</b>	Anf. - Mitte Juli, Neuzüchtung aus Schweden, scharkatolerant, oval-eiförmige Früchte, blau mit leichten violetten Stellen
<b>Jojo</b>	Mitte - Ende Sept., Neuzüchtung aus Stuttgart-Hohenheim, mittelgroße, längliche, dunkelviolette Frucht, lang am Baum haltbar, scharkaresistent
<b>Katinka</b>	Ende Juli - Anf. August, Neuzüchtung aus Stuttgart-Hohenheim, scharkatolerant, mittelgroße Früchte, dunkelviolett bis blau gefärbt
<b>Ortenauer</b>	Ende Aug. - Mitte Sept., große bis sehr große länglich ovale dunkelblaue Frucht, schwacher bis mittelstarker Wuchs
<b>Top</b>	<b>Geisenheimer Spätzwetsche</b> 8 Tage nach Hauszwetsche, große, dunkelblaue Frucht, wegen der späten Reifezeit sehr interessante Spätzwetsche, nach bisherigen Beobachtungen wenig anfällig für Scharka und Pilzkrankheiten

<b>Valjevka</b>	Ende Sept. - Mitte Okt., interessante, scharkatolerante Neuzüchtung, reichtragend, mittelgroße, blaue Frucht
<b>Valor</b>	Ende August - Mitte Sept., Neuzüchtung aus Kanada, dunkelblaue Frucht
<b>Wangenheims Frühzwetsche</b>	Ende August - Mitte Sept., regelmäßige Erträge, mittelgroße, kurzovale, schwarzblaue Früchte
<b>Dattelzwetsche</b>	Streuobstsorte des Jahres 2003 Ende September, alte Steinobstsorte aus Ungarn oder der Türkei, violettrot, grünlich-gelbes Fruchtfleisch, angenehmer, süßer Geschmack
<b><u>Mirabellen</u></b>	
<b>Nancymirabelle</b>	Mitte – Ende August, kleine, feste, hellgelbe auf der Sonnenseite rötliche Frucht; platzempfindlich bei Regen, starker Wuchs; selbstfruchtbar
<b><u>Renekloden</u></b>	
<b>Graf Althans</b>	Ende Aug. - Sept., große, rundliche grünlich gelbe, bei Vollreife blutrote Frucht; mittelstarker, sparriger Wuchs;
<b>Große Grüne Reneklode</b>	Anf. - Mitte Sept., große, kugelige, gelbgrüne, sonnenseits rot gepunktete Frucht; kräftiger Wuchs;
<b>Qullins</b>	Mitte - Ende August, große, hochkugelige, gelbe bis grüngelbe, rot gepunktete Frucht; sehr starker Wuchs;
<hr/>	
<b><u>Pflaumen</u></b>	
<b>Königin Viktoria</b>	Ende Aug. - Mitte Sept., sehr große, ovale, blass goldgelbe, an der Sonnenseite hellviolette, weißgepunktete Frucht; anfänglich starker Wuchs, später mäßig; selbstfruchtbar
<b>Magna Glauca</b>	Mitte - Ende Juli, sehr große, kugelförmige dunkelviolette Frucht; sehr starker Wuchs
<b>Ontariopflaume</b>	Anf. - Mitte Aug., große, rundlich bis ovale grünlich-gelbe Frucht; kräftiger Wuchs;
<b>Ruth Gerstetter</b>	Anf. - Mitte Juli, frühest reifende Pflaume, scharkatolerant, für geschützte warme Lagen
<b>Sanctus Hubertus</b>	Ende Juli - Anf. Aug., mittelgroße, eiförmige, blaue Frucht; mäßig bis starker Wuchs; selbstfruchtbar