

Pfirsich-, Nektarinen- und Aprikosensortiment

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Pfirsiche	Spindel	St. Julien	3,50 - 4,00	1,80 - 2,50
Nektarinen	Busch	INRA 655/2	4,00 - 5,00	3,00 - 4,00

Kernechter vom Vorgebirge **Synonym: Roter Ellerstädter**

Ende August - Anf. Sept., relativ resistent gegen Kräuselkrankheit, mittelgroße grüngelbe, sonnenseits rot gefärbte Frucht, Fruchtfleisch weiß

Junegold

Mitte - Ende Juli, Hauptsorte in mittelmeernahen Anbaugebieten, große gelbrote Frucht, gelbfleischig

Redhaven

Anf. - Mitte August, Hauptsorte des heimischen Erwerbsanbaus, große gelbfleischige Frucht mit schön rotgefärbter Schale

Roter Ellerstädter

Anf. - Mitte Sept., mittelgroße weißfleischige Frucht, widerstandsfähig gegen Kräuselkrankheit und Frost

South Haven

Ende August - Anf. Sept., große gelbfleischige Frucht, sonnenseits rot gefärbt, wichtige Sorte für den Erwerbsanbau

Suncrest

Ende August - Mitte Sept., geringe Anfälligkeit für Kräuselkrankheit und Monilia, große orangerote Frucht, goldgelbes Fruchtfleisch

Morton

Anf. - Mitte August, dunkelrotschalige Frucht, Fruchtfleisch weißlich grün, etwas druckempfindlich

Independence

Mitte August, länglich leuchtend rote Früchte, gelboranges Fruchtfleisch, nicht druckempfindlich

Abstands- und Unterlagen-Empfehlungen

Obstart	Erziehungsform	Unterlagen	Reihenabstand in m	Abstand in der Reihe in m
Aprikose	Busch	St. Julien INRA 655/2	4,00 - 5,00	4,00 - 5,00

Nancyaprikose

Anf. August, altbewährte französische Sorte, relativ robust und frosthart